博淼生物

BIOMIAO BIOLOGICAL

-SINCE2009-

Your own Laboratory

您的专属实验室

Multi-omics在队列研究的多样化场景

报告人：梁海泳

全国统一服务电话：400-6506-908

网址：www.biomiao.com

邮箱：marketing@biomiao.com

地址：北京市丰台区丰管路优橙创新中心B座3012-3015

Multi-omics 队列研究目标

Multi-omics 队列研究场景—Disease based

Multi-omics roles

基因组学 (Genomics)

—What is possible happen

- ✓ 胚系细胞SNP、CNV、InDel等遗传变异
- ✓ 体细胞mutation、InDel等环境突变变异

转录组学 (Transcriptomics)

—What appears to be happening

- ✓ 转录本类型：mRNA、miRNA、lncRNA、circRNA、piRNA等
- ✓ 转录定位：表达、融合、剪切、ceRNA等

代谢组学 (Metabolomics)

—What has happened

- ✓ 脂质组、氨基酸类、胆汁酸类、神经递质类等等
- ✓ 宿主代谢物、微生物代谢物

表观基因组学 (Epigenomics)

—What appears to be happening

- ✓ 基因组：ATAC、HiC
- ✓ DNA甲基化：5mC、5hmC、6mA等
- ✓ RNA甲基化：m6A等

蛋白质组学 (Proteinomics)

—What is happening

- ✓ 功能蛋白质：酶、转录因子等
- ✓ 修饰蛋白质：糖基化、乙酰化等

微生物组学 (Microbiomics)

—The second omics : interact

- ✓ 宏基因组、宏转录组、宏蛋白质组、宏代谢组

Multi-omics approaches to disease research

Multi-omics cohort

Randomized controlled trial(RCT)
随机对照研究

Nested case-control study
巢式病例对照研究
队列内病例对照研究

Case-control study
病例对照研究

Cross-sectional study
横断面研究

Prospective cohort study
前瞻性队列研究

Longitudinal study
纵贯研究, 纵向研究

Case-cohort study
病例-队列研究
病例参比式研究

Multi-omics trajectory to disease research

多组学调控网络构建及因果效应分析

生物学功能通路挖掘及关键调控分子筛选

细胞体外及动物体内分子调控功能机制验证

The Genome first approach

研究目的

研究手段

研究定位的转变

单一GWAS研究的局限性

- ✓ 侧重相关性结论的挖掘
- ✓ 遗传模型对于复杂表型的片面性
- ✓ 高质量队列样本的长周期
- ✓ 非功能区域易感SNP位点的分子调控功能机制挑战

GWAS多组学研究的广阔性

- ✓ 构建不同纬度的QTL调控network以及易感SNP causal结论的挖掘
- ✓ 不同多组学TWAS、MeWAS、PWAS等融合分析及MR随机化因果推断分析
- ✓ 筛选与表型有关的重要生物学通路及其中关键调控功能分子

The Genome first approach — 样本遗传基线数据

The Genome first approach

关联分析研究

- ✓ QTL分析Cis_与trans分析遗传调控网络network构建
- ✓ 精准筛选重要驱动功能基因
- ✓ 以PRS为基础的多组学标记物联合模型优化构建

因果效应分析研究

- ✓ MR分析、COLOC分析、Mediation分析、Condition分析等
- ✓ 探讨不同组学与表型组、暴露因素与表型组、不同表型组间因果关系

The Genome first approach — mQTL 图谱构建及分子调控机制挖掘

Genome-wide association studies of metabolites in Finnish men identify disease-relevant loci.
Nature communications 2022

The Epigenomics first approach — 功能调控中介数据

The Epigenomics first approach

87% of cis-eQTL SNPs, 82% of cis-pQTL SNPs, and 59% of GWAS Catalog SNPs are also **cis-meQTL variants**

	Total SNPs	<i>cis</i> -meQTL			<i>trans</i> -meQTL		
		N of the overlap	Fold Change	P-value	N of the overlap	Fold Change	P-value
<i>cis</i> -eSNPs FHS (1e-7)	460,536	399,670	1.66	0	84,591	2.33	0
<i>cis</i> -eSNPs Eur-Meta	398,524	356,500	1.71	0	70,810	2.25	0
<i>cis</i> -pQTLs FHS-1000g	12,401	10,176	1.57	0	2,045	2.09	0
pQTLs FHS-1000g	19,942	16,660	1.6	0	4,428	2.81	0
<i>cis</i> -pQTLs NC2016	376	318	1.62	0	53	1.78	1.63E-05
pQTLs NC2016	456	385	1.61	0	68	1.89	1.79E-07
<i>metabolism</i> QTLs	135	111	1.57	8.38E-14	26	2.44	6.52E-06
GWAS Catalog	32,260	19,000	1.13	0	3078	1.21	0

The Epigenomics first approach — eQTM分析及分子调控功能机制验证

Discovery Phase (Human Blood)

DNA methylation Microarray

1st Cohort : 40 MDD vs. 40 CTL
|Delta Beta| > 0.2; $p < 3.6 \times 10^{-8}$

RNA Expression Microarray

2nd Cohort : 20 MDD vs. 20 CTL
|Log₂ fold change| > 1; $p < 0.01$

Gene: *BICD2*

Replication Phase (Human Blood)

Sequenom MassARRAY

3rd Cohort: 528 MDD vs. 818 CTL

MSE-qPCR/qPCR: Combined analysis
of DNA methylation & mRNA expression

4th Cohort: 30 MDD vs. 30 CTL

Functional study Phase (Mouse Blood & Brain)

Validation of
human results in
CUMS model

Mapping of brain regions with
altered *Bicd2* DNA methylation
and mRNA expression

Functional studies
in vivo & in vitro

Forced swimming test

Sucrose Preference test

Elevated *BICD2* DNA methylation in blood of major depressive disorder patients and reduction of depressive-like behaviors in hippocampal *Bicd2*-knockdown mice *PNAS* 2022 July

The Microbiomics first approach

The Microbiomics first approach — 宏基因组&蛋白质组联合分析及分子调控机制验证

Relative abundances of core duodenal taxa in the fecal microbiota of children living in Mirpur who have healthy growth phenotypes (n=27) and those with EED (n=48)

分析 36 名环境肠功能障碍 (EED) 患儿的十二指肠微生物群, 鉴定出 14 个不属于典型肠道病原体的 EED 核心细菌类群

特征菌群的绝对水平, 与患儿生长负相关, 与参与免疫炎症应答的十二指肠蛋白 (如 LCN2) 正相关, 且在患儿粪便中的含量不同于健康儿童 ★

和 EED 核心菌相关的十二指肠蛋白, 与血浆 REG3A 等显著相关

定植小鼠 EED 十二指肠菌群的部分分离菌 (含大部分 EED 核心菌) 可能通过促进十二指肠炎症应答, 参与 EED 的发生发展, 从而导致发育不良 ★

The top 10 positive correlations between members of the 14 core taxa and duodenal proteins

A shows the design of the experiment in which gnotobiotic mice

Duodenal microbiota in stunted undernourished children with enteropathy NEJM 2020

The Proteomics first approach

调控功能机制的验证

- ✓ 显著差异蛋白及代谢物的相关性分析、KEGG通路联合分析、PCA比较分析等
- ✓ 系统描绘蛋白至代谢的调控过程，挖掘关键蛋白与代谢物上下游调控通路

多组学联合预测模型构建

- ✓ 单一组学标记物、多组学标记物联合，基于机器学习算法进行预测模型构建及AUC效率比较
- ✓ 分子表型聚类分析，构建不同的分子病理模型及对应的生物机制探讨

The Proteomics first approach — 分子调控功能机制研究

Core functional nodes and sex-specific pathways in human ischaemic and dilated cardiomyopathy
NATURE COMMUNICATIONS | (2020) Article

The Proteomics first approach — 分子调控功能机制研究

Pathways analysis

Network analysis

多维度multi-omics研究体系的发展趋势

博淼技术服务项目一览表

基因组学服务

- GWAS 芯片/WES-seq/Target NGS-seq
- Massarray /Multi-PCR NGS/Taqman /KASP SNP分型
- 16S扩增子测序/宏基因组测序
- HLA-seq/TCR&BCR-seq

表观基因组学服务

- EWAS 芯片
- Multi-PCR NGS 靶向DNA甲基化定量
- Massarray 靶向DNA甲基化定量

代谢组学服务

- 非靶向代谢组
- 非靶向脂质组
- 靶向代谢组项目系列

转录组学服务

- 转录组NGS/表达谱芯片
- RT-qPCR 靶向转录本定量

蛋白质组学服务

- DIA定量蛋白质组/iTRAQ&TMT定量蛋白质组/Label free定量蛋白质组
- PRM靶向蛋白/Olink蛋白定量/ELISA
- 修饰蛋白质组
- 高密度自身抗体蛋白芯片

单细胞组学服务

- 单细胞转录组测序
- 单细胞免疫组库测序
- 单细胞ATAC测序&转录组测序
- 空间转录组测序

多组学联合研究服务

- GWAS&多组学技术服务
- EWAS&多组学技术服务
- 微生物基因组&代谢组技术服务
- 蛋白质组&代谢组技术服务

感谢各位的聆听

Your own Laboratory

——您的专属实验室